目　　錄

內科驗方

喉科驗方

外科驗方

傷科驗方

眼科驗方

針科驗方

內科驗方

一　治小兒消化不良性腹瀉方(五歲以下)

·王惠蒼交流·

症狀: 大便溏薄或如水樣,食慾不振,或有冷嗝者。

驗方: 懷山藥　白茯苓　白扁豆　焦山查　焦神麯　焦麥芽　焦白朮

服法: 各藥等分,研成細末,每次服一錢至三錢,根據症狀的輕重和年齡而不同,每天服三、四次,服時以白糖拌和,米湯送下。

二　治痔出血方

·陳繼高交流·

驗方: 大生地五錢　粉歸身三錢　荆芥一錢五分　防風一錢五分　杜仲三錢　菟絲子三錢　桃仁泥一錢五分　花檳榔三錢　側柏炭五錢　槐花炭三錢　參三七一錢

服法: 研末冲服。

說明: 不論先便後血、先血後便均有效,本人患痔瘡多年,出血時服二劑卽止,出血量特別多時,最多服三至四劑。

三　治痢疾方

·馬逢樂交流·

說明: 用鹹醃猪脚爪骨頭炙灰,用砂糖、陳酒調服約五錢,一服自愈。

四　痢疾散　　•馬逢樂交流•

驗方：茅朮四兩　羌活二兩　生军一兩五錢　熟军一兩五錢
川烏一兩　草烏一兩　焦山查一兩五錢　杏仁四十九粒

服法：各藥共研細末，每日服一次，每次服一錢。紅痢用白糖調，白痢用紅糖調。

説明：此散專治原氣未虛，一切積滯，逗留腸間，以致下痢，重者四、五服，輕者一、二服，就可痊愈。

五　治小便不通方　　•馬逢樂交流•

驗方：田螺洗淨一個，葱根洗淨三個，同打。

用法：敷臍下丹田穴。

六　治濕溫後期方　　•周則愈交流•

驗方：淡附片五分　佩蘭梗三錢　茯苓神各三錢　姜雅連後入四分
廣鬱金一錢五分　製半夏三錢　鮮薑渣三分　江枳實炒二錢
竹茹薑汁炒一錢五分

説明：稽留熱，早輕，入暮灼熱，胸懣嘆氣，煩懊不寐，脈細，苔白不措，腹滞便泄。按此症大多是濕遏熱伏，熱處溼中，中陽不宣，腑氣不降，稽戀不解，表之不可，下之不必，恐傷表傷裹，而成結胸。用附片强心，鮮薑渣辛以宣陽醒脾，雅連苦以燥濕，寒以洩熱，省頭草鬱金為佐，取其芬芳除陳，枳實竹茹取溫膽意，使腑氣得自然下降，苓神淡滲安神。愈侍診時，見家嚴治愈史某及孫某之

妹，一劑知，二劑已，減大半，以後如遇此症狀時，加減論治，無不奏效。

雲翔按：中醫周則愈之父親周聿如先生，爲吾錫邑名醫，在錫邑南鄉擅傷寒者；此方爲其平生經驗精湛之作，對濕溫症後期用法極合，方亦靈動可喜。

七　治甲狀腺腫方　•蔣退畊交流•

說明：海心菜（土名蒿子）產沿海邊岸，此物可能含有碘質，夏秋間摘取其嫩苗，晒乾，煮熟佐餐，其味可口，常服能消縮甲狀腺腫。

八　止盜汗方　•陳立行交流•

驗方：玉蜀黍幹莖內之芯（白色柔軟綿狀物質），用量不拘多少。

用法：煎湯頓服，此方屢試有效，尤以產後虛汗爲然，無刺激反應等弊，且取材容易，在農村中可以不費而得。

九　治痢疾方　•黃伯銘交流•

驗方與服法：上猺桂三分　去粗皮研細末，開水過服，先服一半，一小時後再服一半。生湘軍五錢　挫細末，分三次服，隔二——四小時服一次。

說明：此方適應細菌性痢疾發病之初期，屢有神效，患者忌食生冷，須休息。

十　治小兒喘吼，無熱度，不甚咳嗽方

•陸行周交流•

驗方：片竹黃二分　陳胆星二分　廣鬱金二分

服法：上藥研細末，蜜糖調服。

十一　治小兒腹水，連及腎囊、外腎均腫大方

•陸行周交流•

驗方：元寸香一分　西血珀三分

服法：上藥研細末，蜜糖調服。

十二　治小兒氣喘急、微熱、便祕方

•陸行周交流•

驗方：煨黑丑一錢　煨白丑一錢　生軍二錢　葶藶子五分

服法：上藥研細末，開水調服。

十三　治淋濁方　•陸行周交流•

驗方與服法：白蘇三斤　煎湯代茶，分次服完見效。

十四　治胃痛方（偏於濕重者）•黃漢英交流•

驗方：土炒白朮三錢　香油炒良薑二錢　青陳皮各四錢

炒枳實三錢　尖檳榔三錢　製川朴二錢　白茯苓四錢

砂仁末五分　製半夏三錢　川楝子四錢　淡吳萸三錢

延胡索三錢　生粉草五分　煨木香二錢　乳沒藥各四錢

五靈脂三錢　上沉香三錢　炒茴香二錢　穿山甲炙黃三錢

川連末八分　白蔻仁三錢

服法：上藥共研細末，用木鱉子一錢五分，切片，放入，炒至焦色，將木鱉子取出不用，再研至極細，用磁罐貯藏，每天於飯後服一錢，用鹽湯吞服一次，如有感冒風寒停服。

附註：此方用於神經性胃痛則可，而不能用於胃潰瘍。

十五　治腹水方　·黃漢英交流·

驗方：焦白朮三錢　大腹皮三錢　車前子三錢　京三稜三錢

老木香一錢　茯苓皮三錢　福澤瀉三錢　蓬莪朮三錢

五加皮三錢　冬瓜皮三錢　炙雞金砂仁拌炒一錢五分

大戟八分　黑丑八分　芫花八分

另甘遂末四分　開水空心送下先服。

說明與用法：此方治全身水腫，小便不利，而體力強實者、體虛者及心臟性水腫者不可用。

附註：甘遂末服後，腹中要疼痛，大約十五分鐘，即行大便瀉下，全是水份。

十六　治無夢滑遺方　·陸棠齡交流·

症狀：頭暈目眩，耳鳴心盪，腰痛，盜汗，面色蒼白。

驗方：大熟地一兩五錢　大白芍炒一兩五錢　酸棗仁炙八錢

炙綿黃耆一兩五錢　懷山藥炒一兩五錢　遠志肉甘草湯泡四錢

潞黨參木香湯炒一兩五錢　花龍骨八錢　川續斷鹽水炒八錢

山萸肉蒸一兩　左牡蠣一兩五錢　女貞子七錢鹽水炒

炙甘杞子八錢　菟絲子鹽水炒八錢　金櫻子八錢

全當歸一兩五錢　雲苓一兩五錢　潼沙苑八錢　粉丹皮七錢

福澤瀉鹽水炒八錢　芡實一兩　蓮鬚四錢

服法：上藥研細末為丸，每日早晚各服二錢，開水送下。

說明：如遇感冒及胃口不好，可暫停服用。

十七　治新產腹痛方（可收縮子宮，減輕疼痛）

·陸榮齡交流·

驗方：益母草一錢　全當歸二兩　撫川芎五錢

服法：將益母草洗淨，先煎一小時，然後放入上藥煎至濃汁開水冲服。

十八　治羊癇風方　·陸榮齡交流·

驗方：白蒺藜去刺四錢　九節菖一錢　陳胆星一錢

白金丸三分(另吞開水下)　真滁菊一錢　遠志三錢

青鹽半夏三錢　海蛤散包五錢　雙勾勾後下四錢

薄橘紅鹽水炒一錢　青礞石五錢　炙白前一錢五分

天竺黃一錢　硃茯神四錢　竹茹薑汁炒一錢五分

服法：在發作前服，五劑以後，每天服白金丸三分礞石滾痰丸一錢(合服)

說明：此方須多服，始可減輕症狀，縮短時間，減輕發作次數。

十九　治產後瘀積方（此方用於產後一月之朔）

·李壽康交流·

症狀：產後發熱，有汗不解，食慾不振，煩躁失眠，咳嗽，溲短少，大便結。

驗方：炒荆芥一錢五分　紫丹参二錢　炒車前三錢　白蒺藜一錢五分　上肉桂三分　雅連水炒二分　當歸尾三錢　炮薑五分　杏桃仁各去衣研三錢　淡附片三分　炒防風一錢五分　炒延胡一錢五分　原炒生地三錢　澤蘭一錢五分　穞豆衣五分　益母草煎汁代水

說明：此症内有瘀血，蓄積於子宮，故以溫經逐瘀，内用附桂者，引火歸元，強心利尿也。

二十　治黃疸方

·薛幼竹交流·

症狀：目黃，膚黃，小便如柏汁，大便灰白色。

驗方：真青黛三分　白明礬七分

服法：上藥共研細末，分七包，每日清晨用雞蛋青一枚，空心調服，輕者七服，重者十四服，必效。

二一　治小兒急驚方

·顧復初交流·

症狀：小兒五歲以下抽風痙攣（臨危封臍甚效）。

驗方：三仙丹一分　梅片一分　全蠍三個　殭蠶三條　麝香五厘

用法：上藥共研細末，蜜調封臍，用紗布蓋好，二十四小時始可撤開。

說明：小兒貼此藥之後，能放屁通大便者，其症即愈。

二二　治婦女分娩後無乳方　·顧復初交流·

說明與用法：用結籽老萵苣梗一根，煎湯服下，乳汁即下，最多二服，頗有效驗。

二三　治小兒泄瀉方　·錢介壽交流·

症狀：小兒疳積食傷脾胃，泄瀉便溏或完穀不化，色青而膩，甚則神迷不清爽，兩目凹陷，脈細數無力，舌苔薄白，熱度不高。

驗方：土炒白朮一錢五分　煨木香五分　焦查肉二錢　炒陳皮七分　焙懷山藥一錢五分　炮薑七分　砂仁四分　使君子二錢　煨葛根二錢　上肉桂三分　鷄內金一錢　生熟薏仁三錢　茯苓二錢　炒潞黨一錢五分

服法：上藥加水煎服。

說明：服下很有效驗，誠經驗良方。

二四　治疳積方　·鄧冀全交流·

驗方：以蟑螂去頭足翅，於豬油中熬熱，以糖（最好黃糖）拌之。

服法：一次食五、六個，總量約一百二十個左右，很有效驗。

二五　治肺炎方　·繆德懷交流·

驗方：生麻黃四分　橘紅一錢五分　茯苓三錢　生南星八分

薤白頭一錢五分　枳壳三錢　法半夏三錢　白芥子一錢五分
淨蟬衣七隻　炙紫菀一錢五分　廣鬱金三錢　光杏仁三錢
靈磁石打先煎四錢

服法：上方加減法，四肢麻冷，可加附片五分，腹痛可加細辛，抽攣可加龍齒五錢。服藥後，汗透熱退，可去麻黃，再服一劑，即愈。

二六　治産後惡寒發熱、腹痛方

·邵季全交流·

症狀：四肢浮腫，小便不利，倦怠無力。

驗方：炮薑炭八分　川桂枝六分　車前子二錢　京川貝五分
中生地二錢　懷山藥二錢　紫丹参二錢　建澤瀉二錢
粉丹皮八分　淮牛膝二錢　雲茯苓二錢　上沉香五分

服法：上藥磨汁冲服。

說明：此方産後一月内服，出月亦可，酌量使用。服上三帖，無不見效，百驗百靈。

二七　治半身不遂方　·邵季全交流·

驗方：當歸八錢　天麻三錢

針法：針炙肩髃、曲池、合谷、三穴、環跳、陽陵穴。

說明：宜興城市徐澤民，年四十多歲，患半身不遂，左半手足偏癱，發抖，兩目仰視，頭昏目眩欲仆，大便乾結，性交則精早泄，已有四、五年，經過許多醫師治療無效，延我診治時已服方一百餘張，我用此方，服一劑，大便卽通

軟，頭暈稍鬆，後經鍼灸及地黃飲子繼續内服十餘劑，症勢漸退，以告痊愈。

雲翔按：照上列症狀，頭眩欲仆，大便乾結，重用當歸、天麻，竟能取效，有可議之處，錄之以備一格。

二八　服藥嘔吐防止法　·吳保羅交流·

方法：將病人雙手脈搏處緊握，頸部熱敷，待藥服下後，約五分鐘至十分鐘，方可放鬆，並除去熱敷。

二九　呃逆解法　·吳保羅交流·

方法：葡萄汁或枇杷汁用開水冲飲，立效。先含開水於口中，將手指塞閉鼻耳，然後嚥下溫開水，少停呼吸，放開手指，若一次不效，可行二、三次。

三〇　黃瓜二用方　·吳保羅交流·

驗方：老黃瓜數條，浸雪水中，加生礬一小撮，封置過年，過濾運用，色澄清而黃，味亦不難服。

用法一：内服：夏季腹痛特效，下痢服之有效不一。

用法二：外用：多年老爛脚可洗塗，洗時可冲淡，塗者不可冲淡，並不必拘於雪水。

三一　治肺結核咯血方　·周宏裕交流·

症狀：結核性空洞吐血，食慾不振。

驗方：煅牡蠣二兩　人中白二兩　穿山甲炒二兩　鱉甲炒二兩

象貝二兩　麝香二分

服法：上藥研細末，用阿膠煎湯為丸，或加鳳凰衣（雞蛋殼內軟衣）濃湯為丸亦可。每日服三次，每次服一滿小匙，飯後服。常服藥力更大。亦可減半配製。

三二　治肺炎方　·薛幼竹交流·

症狀：小兒高熱，咳嗽氣急，痰嘶鼻煽，右脇疼痛。

驗方：酒射干一錢　白芥子七分　地骨皮五分　花粉二錢
炙馬兜鈴二錢　玉桔梗七分　丹皮一錢五分　生軍酒炒七分
生紫菀一錢五分　桑白皮三錢　橘絡一錢五分　川貝母一錢

服法：上藥煎服。

說明：上方一劑，病減半，再劑可愈。三歲以下小兒，減半劑量。

三三　桑菊飲　·趙芙春交流·

症狀：初起微熱，繼則高熱，無汗或微汗，乾咳痰少，胸疼。迨後有痰，微覺氣粗，似轉併發肺炎之象。

驗方：桑葉三錢　薄荷後下一錢　桔梗一錢　菊花二錢　甘草八分
蘆根三錢　連翹一錢五分　杏仁三錢　石膏四錢　知母一錢

服法：輕症，服此方一、二劑後，則見痊愈，如熱度增高，口渴欲飲，將桑葉、菊花各加一錢，其熱度大多減退，咳嗽亦瘥，胸疼得減。

說明：此方專治風濕咳嗽（在秋季後較為應驗）、支氣管炎、肺炎。

三四　治初期二期肺結核方　·趙芙春交流·

症狀：咳嗽，脇疼，痰紅，骨蒸，遺精，潮熱，盗汗。

驗方：銀柴胡四分　海蛤散包四錢　肥玉竹三錢　肥知母一錢
川石斛二錢　川象貝各三錢　浮小麥三錢　地骨皮三錢
炒歸身三錢　土炒山藥三錢　香青蒿一錢五分
南北沙參各三錢　炙兜鈴三錢　功勞葉三錢　冬蟲夏草二錢
炒澤瀉一錢　淡茯苓二錢　藕節四錢　穀芽三錢

服法：此方服五劑或十帖後，潮熱、骨蒸等症狀較減或消失，去銀柴胡、青蒿、地骨皮等，另加益胃之藥，循序治療。

三五　黄病丸　·趙芙春交流·

主治：全身無力，尤以下肢無力行走，貪食，貧血，以及鈎蟲所引起的全身貧血，女子方面的乾血，萎黄，月經不調，患者耳鳴，走路時心跳急速，頭暈，腿痛等均可用此方。

驗方：皂礬一斤　鉄屑一斤半　當歸五兩　月月紅一兩　紅花一兩
山查五兩　黄柏一兩　黄連五錢　烏棗半斤　參芽五兩
檳榔一兩　參三七五錢

服法：上藥製成丸藥，用烏棗打成形如菉豆大，每日服三次，每次於飯前服，開水或陳酒送下，每次十五粒，二十天左右卽治愈。

三六　截瘧膏藥　·强冠玉交流·

驗方：草菓仁三粒　白川(卽胡椒)三粒　砒霜少許

用法：共研細，置膏藥上，貼臍上及脈窩及第七頸脊突。

三七　保赤散　　・强文岩交流・

驗方：巴豆霜一錢　去油淨天竺黄四兩　陳胆星三錢
　　壽三梅五分　陽春砂一錢

用法：上藥研細末，治小兒痰火鬱結，喉鳴轆轆，每次服極少量，只可服一至二次。

三八　治牙痛方　　・吳保羅交流・

驗方：青松毛、舊棕剪碎，和煙裝入煙筒，吸一、二筒，立止牙痛（不能去病根，但亦有不復發者）。

三九　治一般性高血壓方　　・鄒雲翔交流・

驗方：熟天麻一錢　白蒺藜四錢　薄荷三分　鮮石斛三錢
　　枸杞子三錢　炒甘菊三錢　十大功勞葉（枸橘葉）四錢
　　茯苓神各一錢五分　東北洋参一錢　穭豆衣三錢
　　粉丹皮三錢　龍齒四錢　川杜仲三錢　淮牛膝一錢五分
　　魁紅棗十個　三角胡麻四錢　金針菜一兩　合歡皮四錢

服法：上藥煎湯服用。

四〇　清腦清炎方（治流行性乙型腦炎）　　・鄒雲翔交流・

症狀：頭劇痛，發高熱、口渴作泛，煩躁，嗜眠，神糊，苔色淡黄，尖絳，肢痿。此病在夏秋季較多，二、三、四月間亦

有之，五、六歲，十七、八歲至三十歲左右男女多患之。孕婦亦有患者，中醫說是溫病之類。

驗方： 天竺黃片五分　東北洋參一錢　白蒺藜三錢　黑玄參四錢　大生地四錢　白薇四錢　鮮蘆根四兩　穭豆衣三錢　川貝母一錢　綠萼梅三分　鮮荸薺十枚　陳海蜇一兩

說明： 七、八月間無荸薺時用鮮藕四兩　生牡蠣五錢　先煎。

四一　治急劇性腎水腫方（即風水）

・鄒雲翔交流・

症狀： 發熱惡寒，周身浮腫，小便短少，腰身痠痛，喘息挾痰。散風消腫利水，上下分治。

驗方： 麻黃三分　桂枝四分　獨活八分　防風八分　防己一錢　蘇子一錢五分　蘇葉八分　黃耆皮四錢　雲苓皮各三錢　廣皮二錢　桑皮一錢　東瓜皮四錢　生杏薏仁各一錢五分　飯赤豆杵五錢　桑寄生三錢　腹滿可加椒目五分　薑皮一錢　紅棗七個

熱退消腫氣平，溫補脾胃：

黃耆皮各二錢　炒白朮三錢　炒廣皮一錢五分　防風四分　防己一錢　大潞黨三錢　生熟薏仁各一錢　雲茯苓三錢　炒山藥三錢　炒東瓜皮三錢　金匱腎氣丸一錢五分包煎

服上方數劑後微腫全消，續服下方：

生炙黃耆各三錢　炙甘草一錢　大潞黨三錢　茯苓神各一錢五分　潼沙苑三錢　白蒺藜一錢　廣皮一錢五分　淨芡實一錢五分　桃仁泥五分

炒冬朮一錢五分　炒山藥一錢五分　飯赤豆四錢
炒當歸一錢五分　酒洗巴戟天一錢五分　防風三分
胡桃肉四錢(不去衣)　乾鮑魚三錢(切片)

四二　治亞急性腎水腫方　·鄒雲翔交流·

驗方： 黄耆皮各四錢　炒潞黨三錢　雲苓皮各三錢　炒白朮三錢
防風六分　防己一錢　鮮薑皮一錢　黑紅棗各五個
生薏仁一錢五分　炒廣皮二錢　五加皮三錢　飯赤豆杵三錢
金匱腎氣丸三錢包煎
苔白加川朴三分　製附子三分
氣短加桂皮三分
腰痠加酒炒杜仲、酒洗巴戟天

四三　治結核性腦膜炎方(俗稱慢驚)

·鄒雲翔交流·

症狀： 多為續發性結核病，初起時緩和，精神不振，好睡，性情反常，頭痛，厭食，易吐，腹瀉或便祕。初期僅有微熱，以後漸高，年齡愈小，病變愈重，二、三星期後，就會由神志不清，漸入驚厥狀態。

驗方： 烏蠍尾二分　茯苓神各一錢五分　九節菖蒲後下六分
橘紅一錢五分　牡蠣三錢　淡附片一分半　冬朮一錢五分
天麻四分　遠志八分　白蒺藜一錢五分　鹿角霜三錢
黄耆二錢　黨参三錢　胡桃肉四錢　象貝母二錢

用法： 上方用藥分量，可視病者年齡大小，酌量增減。

附註：宜興學員程郛生醫師來信：(上略)前日在錫進修時，多承教育，銘感不忘，又承指示幾種治病經驗良方，回來研究治療，頗有效驗，的確吾師醫學深湛，經驗豐富，實深讚佩。曾有十歲女孩，經武進醫院用X光檢視，患粟粒性腦膜炎肺結核，經治多次不效，就用老師之藥方，連服五劑，食量大增，再經醫院檢查，肺上已無斑點，可稱痊愈。

四四　固精丹　　•鄒雲翔交流•

驗方：密陀僧一錢　五棓子一錢　海螵蛸一錢

製法：以上三味，研極細末，篩去粗末，候用。

用法：每晚臨臥前，用少許摻龜頭上，如果包莖，即用凡士林少許擦龜頭上，微潤後，再摻藥末，其夜精不遺。

四五　探胎法　　•錢介壽交流•

驗方：川芎五分——七分

服法：研細末，熱開水過下。

說明：女子懷孕二、三個月而不自覺，或初次懷孕而不能確定，却有胃納不佳，精神困倦，而疑有病，可服此藥末以探之，服後約1—2小時，覺臍左下方內部有翕翕作動，即是有孕之徵。

注意：服後須靜臥(平臥)，因翕翕動，不過甚，如粗心者，則不自覺。

喉科驗方

一　治喉中潰瘍，能長肉生肌方(吳氏又名子藥)

·黃伯銘交流·

驗方：明硃砂六分　硼砂五錢　梅片五分　玄明粉(製)五錢

用法：研極細末。

二　治口瘡方(吳氏又名寅藥)·黃伯銘交流·

驗方：青黛一兩　人中白五錢　黑山梔五錢　梅片一錢
厚朴五錢(用黑棗煆存性)

用法：上藥共研細末。

三　治單雙乳蛾方(吳氏又名巳藥)

·黃伯銘交流·

驗方：梅片二分五厘　雄精二錢　焰硝一兩五錢

用法：上藥共研細末。

說明：未潰可用，孕婦忌用。

四　治喉中痰塞方(吳氏又名午藥)

·黃伯銘交流·

驗方：川黃連一錢　明礬一錢　牙皂一錢(焙存性)

用法：上藥共研細末。

說明：此藥性太猛，孕婦忌用。

五　治重舌方（吳氏又名戌藥）·黃伯銘交流·

驗方：硼砂三錢　玄明粉二錢　青鹽一錢

用法：用火煆紅放在地上一日。

六　治一般喉痛乾燥方（喉嗆噙化丸）

·强冠玉交流·

驗方：大梅片三分　大貝母三錢　訶子肉二錢　西月石四錢

煆胆礬一錢　元参三錢　元明粉四錢　薄荷五錢

黑山梔三錢　生甘草二錢　桔梗二錢

用法：共研細末，煉蜜為丸，如桐子大。

外 科 驗 方

一 治鵝掌瘋方 ·周宏裕交流·

症狀：四肢角化，石灰手指。

驗方：生川烏三錢 浮萍草三錢 土荊皮三錢 生草烏三錢
杞子三錢 九節菖蒲三錢 牙皂三錢 薑蠶三錢
威靈仙三錢 羌獨活各三錢 防風三錢 白鮮皮三錢
大貝三錢

用法：上藥用醋浸二十四小時，醋二斤，煎濾，洗手浸於醋中，每天五、六次，一劑浸一星期。

二 治癩痢頭方 ·周宏裕交流·

驗方：腰黃二錢 蜈蚣五分 月黃五分 冰片二分 密陀僧四錢
三與砯八分 青黛二分 大黃五分 輕粉二分

用法：共研細末，橄欖油調，或用菜油亦可，早晚期均有效，敷藥前，先將癩蓋去淨，先用灰錳氧洗淨而後敷藥。

三 治火燙方 ·周宏裕交流·

驗方：地榆炭不計多少，研末。

說明：此方是從冶坊中得來，一切水火燙用菜油調敷。

四　薰痔方（民間祕方）　　•周宏裕交流•

驗方：瓦葦（即瓦花）洗淨後，用清水煮沸十分鐘左右取出，放在罎中，患者坐在上面薰之，大約薰半小時左右，連續四、五次，重者增加次數，很有效。

五　治凍瘡方　　•周宏裕交流•

驗方：瓦楞子不計多少，研極細末，加龍骨少許和勻。

用法：潰爛者，用橄欖油調敷，一日二次；未潰者，敷於發炎處，再加棉花包紮，使四肢溫暖，二、三次可以痊愈。

六　治乳頭風方　　•周宏裕交流•

驗方：用白芷研細末，用人乳調。

用法：在飯鑊上燉後，敷在患處，很有效，不過要停哺乳一日夜。

七　治蛇咬方　　•周宏裕交流•

驗方：半枝蓮打汁飲之，渣敷於傷處。

八　治扁桃腺炎方　　•周宏裕交流•

驗方：以臭花娘子根打汁，飲約半碗，於發炎時服之，很有效。

說明：此係民間祕方，服二次後永不復發。

九　金鎗一滴凝(治創傷出血)·周宏裕交流·

驗方： 生石膏二兩　血竭二兩　海螵蛸一兩　煅龍骨五錢
要水飛

用法： 上藥共研細末。

說明： 主治刀傷出血，一切創傷，肌肉皮膚出血，且可生肌。此藥在微小血管損傷出血時用之頗效，但對於大血管損傷出血，則必須進行結紮血管以止血。

十　穿粉散(治耳旁小水泡)　·黃劍純交流·

驗方： 鉛粉一錢五分　掃盆五分　老緯丹四分　炙甲片末一錢

用法： 上藥共研細末，用生菜油調敷患處，一日兩次，初敷時患處滲出黃水甚多，繼續敷之可自行收乾脫痂。最主要此症不可用水洗滌，否則要蔓延不愈。

說明： 此散主治耳之前後發生密集小水泡，有滲出粘性之黃水而發痒，搔之則溢血而有腐皮，耳朵腫脹，稱為旋耳風毒之濕症。

一一　治瘰癧方　·黃劍純交流·

驗方： 活天龍三條(即壁虎，先風乾，再放在瓦上煅存性)
雄黃二錢　樟腦一錢

用法： 上藥研極細末，用麻油調後，以筆蘸藥，敷於潰破之瘡口內。患者用此藥後，很覺舒服，並有時患處發痒，瘡口可逐漸收好。

說明：此藥主治瘰癧潰破，串爛不愈，甚至經數年治療無效者，用此方收口甚速。

一二　濕毒黃水瘡藥膏　　·馬逢樂交流·

驗方：凡士林、蠟燭油各半熔合；如痒，如稍加明礬；如有膿水，可加一些拔毒藥。

一三　枯痔散　　·馬逢樂交流·

驗方：紅信石淨末一錢（放瓦上煆，待白烟淨取起淨末）
枯礬二錢　烏梅肉炙存性二錢　飛硃砂三分

用法：上藥共研極細末，用時以藥敷於痔頭上搓擞（周圍好肉上不敷）。

一四　蛇啄點眼藥　　·馬逢樂交流·

驗方：明雄精水飛一兩　牙硝四兩　寸香五分　大梅片三分

用法：上藥研細末，收貯勿洩氣。如遇蛇咬，可將此藥點於眼角，男左女右，並將此藥再點於傷處，自有黃水出，至水盡為止。

一五　移痘丹　　·馬逢樂交流·

驗方：輕粉五分　豬牙皂五分　大梅五分　東丹五分

用法：如遇天花出於目中，可將此藥吹於耳中，如在左目吹右耳，右目則吹左耳；每次黃豆大，約三、四小時吹一次至二次，可移去。如發覺太晚，吹之不效。

雲翔按：現在預防認眞，天花已絕跡，錄之以備一格。

一六　癩疥瘡藥（又名合掌散）·馬逢樂交流·

驗方：西丁（卽硫磺）二兩　鉄銹三兩　明礬一兩　胡葱汁一小杯　輕粉一錢

用法：先以前三味研細末，再加輕粉研之，次以胡葱打汁入諸藥，調之如糊漿，塗於碗內，用艾葉燃，使藥薰乾，冷後除下，研細末。用時超一指甲於掌心中，以麻油二、三滴合掌搓之，每日至多二次，可焦頭，痒停。在用藥前，最好先洗浴，搽之極效。

一七　治疔毒方　·張友樵交流·

驗方：麝香　珠粉　犀黄　冰片

用法：上藥等分，加紫金錠末一半，細研敷上。

說明：治頭面疔毒走黄，腐肉不起，用之化水消腫，其價頗貴，然所用不多。

一八　治鼻中瘜肉方　·張友樵交流·

驗方：白明礬　硼砂

用法：上二味等分，塞鼻。

一九　爛脚藥　·張友樵交流·

驗方：蘆甘石研末，用麻油白蠟煎，調塗。

二十　章氏追龍丸　　　・盛培康交流・

主治：淋巴腺結核，虛痰，一切陰症不痛之症，一切痰塊，奶痰等，均有神效。

驗方：生甲片一斤　生斑貓（即斑蝥）半斤

製法：上藥共研細末，用糯米飯為丸，如芥子大。未穿用硃砂為衣，已穿用甘草末為衣。

服法：每日吃一粒，不可多吃，如果多吃，小便不利。

雲翔按：無錫清名橋章治康外科名醫，其子孫世其業，至今不衰。此方為其家傳祕方，向不示人，學員盛培康醫師，在章氏習外科有年，將此方交流出來。希望各地醫務工作同志，應用試驗，再作切實報告。

二一　消散丸　　　・盛培康交流・

主治：流行性癰疽發背等，並治一切無名腫毒。

驗方：生甲片一斤　蜈蚣一百條　全蠍四兩　斑蝥二兩

用法：上藥研細末，糯米飯為丸，如豌豆大小，每日服三粒，開水送下，七天至十天可以消散。

說明：倘已有寒熱，可內服煎藥。藥方如下：

全當歸酒炒三錢　羌獨活各一錢五分　粉丹皮二錢
絲瓜絡酒炒三錢　西赤芍一錢五分　黑山梔三錢
炙甲片二錢　桃仁泥三錢　土全虫七隻
原紅花一錢　牛膝酒炒三錢　延胡酒炒一錢五分
炙乳沒各三錢　倘有膿象加黃耆三錢　角針去刺三錢

二二　化毒丹　　　　　·盛培康交流·

主治：梅毒或梅毒性的外症。

驗方：水銀二分　紅升二分　以上二味取大棗五個同打

製法：先把棗肉和水銀打至不見水銀，然後下紅升打和，每次服米大一粒，開水送下，服後忌吃花生、雞蛋。

二三　治皮膚病方　　　　　·蔣退畊交流·

主治：乾性疥癬。

驗方：先用次亞硫酸鈉（即照相中所用的大蘇打）三克，用蒸餾水十五西西溶化，搽塗患部，約十分鐘後，再用稀鹽酸溶液搽擦，促助次亞硫酸鈉迅速發揮其殺菌止痒作用。

說明：普通用的硫磺軟膏治疥癬，非但有臭味，且能污染衣服，並能刺激皮膚，引起他種炎症。本方優點是使用便利，既無臭味，又不污衣，更無刺激，連用三次，即可全部殺滅疥蟲癬菌，故較硫磺軟膏為佳。

二四　治兩手指勾彎如雞爪狀·徐南甲交流·

驗方：全當歸酒炒四錢　明天麻煨一錢五分　滁菊一錢
木瓜酒炒一錢五分　紫丹參三錢　白蒺藜去刺四錢
防風一錢五分　大胡麻三錢　大白芍一錢五分
秦艽一錢五分　伸筋草一錢五分　雙勾勾後下三錢

說明：此方須服一、二十劑可痊愈。

二五　拔疔毒方(局部用)　　·夏志平交流·

驗方：生熟蛤蜊各四錢　熟石膏四錢　飛滑石二錢　雄精一錢
杜黄升二錢　麝香一分　西黄一分

用法：上藥研極細末，疔潰後，紅腫疼痛，發熱時，卽用之，至膿暢腫消時，卽改用九一丹，此方不可用至收斂。

二六　牙痛外治方　　·夏志平交流·

驗方：用生大蒜頭一束，打爛，放入輕粉二分拌和，塗入虎口穴，用蜆子壳(卽小蛤蜊壳)一個，蓋沒塗藥，再用手帕或紗布紮緊二、三小時，卽可除去藥物，卽見一個泡，用銀針挑破，出水後，用紅汞水消毒卽可。

用法：男左手虎口，女右手虎口，塗藥前，須將虎口穴以75%酒精消毒，蜆子壳須洗淨後煑沸消毒，以免虎口發炎，其效如神，永不復發。

二七　治外痔出血不收，疼痛不安方

·黄煥庭交流·

驗方：玉精炭、老三梅少許用麻油調塗，停一時，卽可止疼收縮，决不再發。

雲翔按：玉精卽蜒蚰。

二八　治火燙及沸水燙傷方　·顧復初交流·

驗方：用雞蛋煑熟，剝出蛋黄，放在鍋內，炒至深黄透油時劃

起，用夏布搞出油質，俟冷後，略加冰片少許，敷於患處，如有水泡，挑穿，二、三日就可生新肌。

二九　風火牙痛外治法　　・顧復初交流・

驗方：山柰末少許，用消毒棉花包好，納入鼻中，左痛塞右鼻管，右痛塞左鼻管，俟其流清涕之後，牙痛漸漸消退；治齲齒時間較久，亦有效驗。

三〇　治乳房內結塊方　　・錢介壽交流・

驗方：柴胡七分　炒歸尾三錢　炙甲片二錢　蒲公英四錢　炒延胡一錢五分　赤芍二錢　炙乳沒各二錢　大貝母三錢　製香附二錢　淮牛膝酒炒二錢　橘皮一錢五分　橘絡七分　廣木香七分　川楝子三錢　桃仁泥二錢

說明：乳房結塊疼痛，在初起時，惡寒發熱，皮表尚未發紅者，服此方即能消，非常靈驗。

三一　蝌蚪解毒愈瘡散　　・錢介壽交流・

驗方：在清明時，河水內有蝌蚪，用網取起，置甕內封口，再以石灰塗之，俟乾後，葬入大路口，約二、三年後取出，將錦紋大黄不拘多少，浸晒七次後，研末，內服，每次大約二錢，每日一次，用蜜調，開水過下。服後，即會瀉肚，約瀉二、三次，即能痊愈。

說明：此方治皮膚瘡疥有特效。

三二　治鼻中瘜肉中　•錢介壽交流•

症狀：鼻孔或左或右的鼻柱旁，發生紅腫粒子，而覺疼痛者。

驗方：輕粉一錢　杏仁一錢　雄精一錢五分　麝香三分

用法：先以杏仁打成塊，再加入輕粉、雄精、麝香末，貯磁瓶中，待用。臨用時，以藥棉蘸藥少許，點在瘜肉上，每天一次，一星期可愈。

三三　移花散　•鄧冀全交流•

驗方：大梅　豬牙皂　輕粉　東丹各等分

製法：上藥研極細末，貯瓶內，不可洩氣。

用法：天花出花左眼可吹在右耳，右眼可吹在左耳。吹藥時，不可過重，以免傷及鼓膜，每隔五、六小時吹一次。但已見膿點則無效。

三四　黃水瘡外搽膏　•鄧冀全交流•

製法：凡士林1磅、柏油7.5磅烊化溶和。

說明：此藥治小兒頭上之濕瘡，痒甚流脂，不可洗淨，以此膏搽之(忌水洗)，有脂水，可以紙吸之，約搽七、八次，即可痊愈，很有效，但對先起黍米樣小紅瘰而後出水者，則無效。

三五　平胬散(原名烏龍丹)　•鄧冀全交流•

驗方：烏梅、熟地(用生地效更佳)各等分研末

說明：治瘡口瘜肉突出，久不收口，以此滲之，即可漸平而收口。

三六　治牛皮癬方　•鄧冀全交流•

驗方：海金砂五錢　土槿皮三錢　方八（即番木鼈）五粒去皮切碎
蜈蚣大的五條打碎　斑蝥五隻打碎　全蠍五隻打碎
以純酒精約一磅浸約一星期即可用。

說明：凡久治不愈的頑癬及各種癬，以此藥搽之都有效。

三七　蛇啄藥　•鄧冀全交流•

驗方：明雄精水飛一兩　牙硝提純四錢　原寸香三分　冰片三分

用法：上藥共研細末，男左女右，點於眼內，一日夜約兩次即可，被咬處以米泔水洗後，以稍濃之鹽水調麥粉成糊塗之，自有脂水流出即愈。重者可行第二次點眼，傷處如無脂水流出，即可以刀（忌鐵刀）於四周劃破，待傷處流血放脂，脂盡則愈。

三八　治陰吹方　•鄧冀全交流•

驗方：鮮豬油一斤，放入鍋內煎熬去渣，加入鷄蛋大一團頭髮，熬至溶化，去殘渣，取油，内服即效。

三九　冰柏散（外症敷藥）　•丁柏仁交流•

驗方：西月石五分　川柏粉八分　杜黃昇四分　真硃砂二分
老三梅二分　陳松香八分

說明：治發背對口，凡一切肌肉壞死，腐根不脫，疼痛難受，用此藥則不用刀割，劃腐卽脫，膿液滲淋，直至新肌驟生，該藥卽停止之。此方極有效。

四〇　治走馬牙疳方　　•繆德懷交流•

驗方：綠礬一錢　石膏煅三錢　粉兒茶一錢　硼砂一錢　人中黃一錢　冰片二錢

用法：上藥共研末，以甘草湯浸藥棉拭去腐肉後，再塗此藥。

說明：主治大人熱病之後，火毒留胃，或小兒疹子之後，變為牙疳，白腐口臭，潰爛不堪，或發痒，齒脫腮硬。

四一　治疔毒方　　•李伯千交流•

驗方：黃升藥五分　冰片一錢　角霜一錢　天龍一條　龍衣二條　蜈蚣二條　耳膜二錢

用法：原藥用一成和凰鳳衣九成，研末，這樣合在一起就成為癰疽靈丹，如膿水不多，用甲片末三分，冰片少許。

雲翔按：鳳凰衣就是孵胎鷄蛋殼內的軟衣。

四二　瘰癧消散之一（大紅硇砂散）

•李伯千交流•

驗方：豬牙皂三錢　炙甲片一兩　青白川五錢　東丹一兩　蓽撥四錢　辰砂五錢　紅硇砂三錢　蜈蚣十四條　全蟲卅二隻　雄黃三錢　元寸一錢　大梅片五分　帶子蜂房炭一兩

用法：上藥共研細末，收貯待用。

四三　瘰癧消散之二（八將丹）•李伯千交流•

驗方：金頭蜈蚣七條　全蠍十六隻　生廣軍五錢　蟬衣五錢
雄黃三錢　炙甲片五錢　月黃五錢　加元寸五分
又加梅片五分

製法：上藥共研細末，愈細愈妙，收貯待用。

四四　瘰癧消散之三（黑虎丹）•李伯千交流•

驗方：雌雄天龍各三條　雄黃一錢　置於瓦上煆時存性，研細末後，加元寸三分　梅片三分。

四五　瘰癧消散之四（黃黑虎靈丹）

•李伯千交流•

驗方：天龍二條　水蛭（即水中沙搭）二條，煆時用雄黃三錢置於瓦片上，用炭火煆存性，色黃黑。

說明：瘰癧消散四個方的用法是：這四個方都是研成藥粉，混合使用；混合的比重為大紅硇砂散佔百分之五十，八將丹、黑虎丹、黃黑虎靈丹各佔百分之十六點六。將此種混合的藥粉摻於千捶膏上，貼於未潰的瘰癧的患處。貼此膏藥後患處現象是：陽症（紅痛者為陽症）消散，陰症（不紅不痛者為陰症）逐漸縮小。此藥粉摻於千捶膏上貼，可半個月換一次。如果摻於普通膏藥上貼，容易破碎泄氣，則須三四天換一次。陽症貼後三天即能消散，

陰症較為緩慢。

四六　瘰癧內消丸　　　　•李伯千交流•

驗方： 雌雄鯽魚一對　蜈蚣七條　鱉魚頭陽乾七個
天龍(壁虎)七條　肥皂子七粒

用法： 將魚剖腹後，蜈蚣甲頭合入腹內，對合鑲好，用陳上下瓦並塊封固，於炭火上煆存性，研細為丸，貯放在新生石灰的甕甏內蓋緊，可以一兩年不會變質。每服三錢，服後無副作用，亦不引起其他不良後果；患者只要不吃黃魚，其他不必忌；生活上應避免疲勞，並須解除一切顧慮，務使精神愉快，息心靜養。服後兩個月才顯效果，服四個月可以痊愈。

四七　九一丹　　　　•李伯千交流•

驗方： 斑蝥去頭足翅一兩　籐黃九分　元寸一分　共研細末，薄漿為丸，如鼠糞大。

說明： 治瘰癧已久而未成膿者，可將此藥放入，其方法將刀開一粒米深，即可放入，以膏藥蓋之，可消。

四八　治濕瘡方(俗名黃水瘡，類皮膚糜爛性濕疹)
•范新治交流•

驗方： 密陀僧研細末，和入麻油，調成糊狀。

用法： 塗於患部，每日二次，約四、五天，即可能結痂而愈。如患部奇癢者，可加銅綠少許，臨用時配入研和，以麻油

調和。又如病灶部發炎紅腫者，可加少許冰片，臨用時加入研和，功能鎮痛消炎，止痒收斂，減少分泌結痂等。

四九　治鵝掌瘋方　•范新治交流•

症狀： 手上脫皮燥裂

驗方： 瓦花七兩　打汁，加入等量酸醋，投入豬小肚（卽膀胱）內，以手浸入，在手腕處紮緊，隔日更換一次，約四日取去，卽不復發。

五〇　瘡癤一刀術　•陶志侃交流•

說明： 一般瘡癤，已有膿時，可把病灶部做好局部消毒，然後根據一針術麻醉後，卽切開排膿，擠出膿後，卽以4%石炭酸溶液，加溫，浸入消毒紗布，乘該液溫熱而略帶溼時，放在切開之瘡口上，再加消毒之小方紗布包紮，隔五日除去，卽可愈合。

五一　治對口疽方　•史竹青交流•

驗方： 吳萸五分　九一丹五分　加京三梅（冰片）少許

用法： 上藥共研末，用膏藥貼上。

說明： 專治偏對口疽，刺破後，用膏藥貼上，一日兩次，數日後自愈。

五二　搯背散　•周魁千交流•

主治： 治發背、對口疽之圍藥，可以使範圍不致擴大，早日排

膿。

驗方：老松香一斤，用桑梗灰水煎之，煎透為度，倒於冷水內，然後用手或棒互相搭和，至顏色發白為止。冷後發硬，研成細末，加少許青黛，卽成。

用法：將絲棉紙剪成患處大小一樣的三張，患處如有白頭或糜爛者，可挖一孔，以便摻拔毒藥，將絲棉紙一張摻上箍背散一厚層蓋上，其餘二張，用花露水潮溼貼於患處，不一日卽成硬壳樣，箍住患處，不使擴大，且易使蒸服而擠出。

五三　耳痔磠砂散　•周魁千交流•

驗方：腰黃（雄黃）三分　西月石五分　鎗硝五分　鹽磠砂一錢

用法：上藥研末，用瓶收貯，用時可將少許摻入耳內，以棉團塞好，每日一次。

說明：耳痔卽耳內瘜肉，除用手術摘出外，本方可以消之，並無痛楚。但是耳內流膿，而發生肉芽組織者，以不用為宜，因用此藥疼痛。

五四　治繡球瘋方　•周魁千交流•

驗方：紫蘇葉

用法：先以此葉包陰囊，外加荷葉包上，一夜卽可長好皮膚，能治陰囊破潰。

五五　去腐丹　　　　　　　　·馮懋績交流·

驗方：白胡椒研細末

說明：發背、對口疽以及火炎疽之白黑腐肉，用此藥摻上，卽易脫腐。

五六　治漏底瘡方　　　　　　·馮懋績交流·

驗方：白附子研細末

用法：摻於足底患處，外貼白紙膏藥，每日換一次。

五七　疥瘡藥　　　　　　　　·强冠玉交流·

驗方：皮硝二兩　升藥底二兩　煙膠一兩　蛇床子一兩
生礬二兩　東川炒焦一兩　大風子仁一兩　樟腦五錢
西丁（卽硫黄）八錢　水銀三錢

用法：上藥研細，用生豬油搗勻，用粗夏布包藥，遍身揉擦，每日一次，八日痊愈，隔日洗澡一次，成人總劑量為三市兩。

五八　治蛇丹方　　　　　　　·吳保羅交流·

驗方：雄黄（上好的）和大蒜頭同磨，塗於患處，有良效。

五九　凍瘡外治法（未潰者）　·吳保羅交流·

方法：將患處先浸入溫水，再浸入冷水，再浸入熱水，依照下面的次序：溫水→冷水→溫熱水→溫水→冷水→溫

水→熱水→溫水，每次約浸五分鐘到十分鐘，大約二天內可消腫塊。

六〇　治耳菌方　　•盧志宏交流•

驗方：用苦參子搗碎點之，其菌卽消。

六一　治疔毒方　　•李伯千交流•

驗方：斑蝥一錢　甲片一錢　磁石一錢　壁虎雌雄一對
鱔頭陰乾七個　路路通一錢　蜈蚣七條　売灰蛇蜕三條
耳膜一錢五分　龍骨一錢　各味生研細末。

用法：在疔未有膿時，以刀割破外皮，以此藥用之見奇效，可免開刀之苦，宜用於未成，發散。

六二　治鵝掌瘋方　　•陳濟中交流•

說明：本人的小孩，在三歲時，兩手掌和兩足底慢慢的發厚變硬，並有裂紋，指甲尚未變白灰質。初步向西醫單某求治，據云這是絲狀菌，用土肥氏軟膏塗擦好幾天無效。後由友人介紹内服臭梧桐花和豬胃，據云可以吃好，並說明這是鵝掌瘋。我依他的意見，治療之後，因藥味苦，小孩子年幼不肯吃。我就另想一個辦法，單用一個豬胃加入食鹽少許，切碎，裹了餛飩給他吃，他就肯吃了。五天中吃完這隻豬胃，因覺麻煩就不再給他吃。經過半個月，檢查手掌和足底都復原如常，皮膚就變軟潤細膩。今年已十三歲，並沒有發其他病情。在服藥期

間，並沒有其他反應，對腸胃亦無變化，小便也無變化。

驗方： 豬胃一隻，臭梧桐花一兩(晒乾的)，將花納入豬胃，再用陳酒半斤，也灌入豬胃內。因豬胃有上下兩口，須先將下口用綫紮緊，方可納入花和陳酒；納入後，上口也用綫紮緊，以免酒流出，然後放入罐中；罐中要加些清水，然後用文火煑爛為止。

服法： 將豬胃拿出，放在另一碗中，將花去掉，單吃豬胃和藥液，一隻豬胃，做兩天服完，或者一星期服一劑，連服三劑亦可。

六三　治盲腸炎方　　•陳濟中交流•

症狀： 初起臍部右側與小腸之上端有紅腫發熱象，手按之痛極，而小腹脹滿，身熱煩渴，最顯著的是右腿必屈伏，緊貼於小腸之旁，不能伸直，痛楚難堪，俗名縮脚腸癰。

驗方： 紅藤(又名老佛藤、省藤)一兩　黃酒兩茶杯煎服。

說明： 此方是前三年偶然得之，因鄉人患盲腸炎，經無錫某醫院割除，須三、四石米價，鄉人當時困難無力應付，聽說有此靈方，就照方三、四服，結果保全生命而愈。近兩年患此病者，都是服用紅藤一兩，酒水各半煎服，確實有效，已治過四個病人，都是痊愈。

傷科驗方

一 萬傷 •丁伯仁交流•

說明：萬傷是一種同野葡萄棵一樣的藤本，藥用是採其根，去其根中之莖，晒乾，研為細末。

應用範圍：(一)凡是跌打損傷，均可應用。尤為特長的是旣可內服，又可外敷；內服一日三次，每次三至五公分，溫酒送下；外敷只需用開水調之。如果損傷部有創口，創口上不要敷之，可敷於創口之周圍。此方係自儆師武進王道平處得來，受傷的程度不論輕重均可能奏效。

(二)一般的急慢性關節炎，均可敷之。

(三)類似結核性膿瘍亦可敷之。

附註：此藥之藤葉根棵本，可向武進前横鎮郵代轉後漳湟王文義同志處收集。

二 回春七厘散 •黃煥庭交流•

驗方：地鱉蟲一兩 頂血竭二兩 生錦紋一兩 製乳香一兩 製沒藥一兩 木耳灰一兩 自然銅醋煅二兩 全當歸一兩 骨碎補一兩 當門子五錢 仙根草二兩

用法：每服一錢，陳酒送下。

說明：專治跌打損傷，在危急時服用。

三　傷末藥　　・黃煥庭交流・

驗方： 防風二錢　五加皮三錢　山藥一錢　川芎二錢　紅花二錢　甘松二錢　乳香一錢　沒藥一錢　白芷一錢　人中白二錢　血竭二錢　桔梗一錢　得打三錢　細辛一錢　當歸一錢　寸香一錢

用法： 上藥共研細末，每服二、三錢，酒下。

四　治損傷悶氣方　　・黃煥庭交流・

主治： 跌傷悶氣，不能坐臥。

驗方： 傷上部用藥：廣木香八分　全當歸一錢五分　紅花六分　川續斷一錢五分　枳殼一錢　製香附三錢

傷腰部加：杜仲三錢　補骨脂二錢　菟絲子炒打三錢　廣木香八分　全當歸一錢五分　紅花六分

服法： 上藥用水煎服，煎時加黃酒一盅同煎。

五　傷敷藥（接骨用）　　・黃煥庭交流・

驗方： 薑黃五錢　蒲黃五錢　生大黃一兩　生牛膝五錢　葛花五錢　全當歸一兩　川烏五錢　草烏五錢　杏仁四錢　生南星五錢　生半夏一兩　山柰四錢　甘松二錢　五加皮五錢　芙蓉葉一兩　自然銅醋煅一兩

用法： 上藥共研細末，用醋調敷，或用雞蛋清調敷。

眼 科 驗 方

一　撥雲散　　　　•湯德良交流•

主治： 白翳攀睛以及羞明之症。

驗方： 野薺粉五錢淸水飛　九製甘石五錢

生甘草不拘多少煮水飛　上頭砂一錢淸水飛　上濂珠二分

廣犀黃二分　熊胆五厘　西血珀二分　滴乳石二分

老三梅五分　枯礬一分　豬血腦五分　元寸一分

白丁香三錢淸水飛

用法： 上藥研極細末，舌舐無渣為佳。用藥後眼睛不可就張開，需要閉眼半小時以上為佳。

說明： 此藥方很有效，已有數十年經驗證明。

二　綠內障　　　　•周禮暢交流•

說明： 初起一目先昏暗，次後兩目漸漸同，外似好目瞳神轉，有似淡霧濃煙捲，至後叫苦先失明，回思求醫已太遲，若初早醫服此靈。

驗方： 煨天麻一錢　銀柴胡一錢　大遠志三錢　福澤瀉三錢

生熟地各三錢　青防風三錢　甘菊炭三錢

茯苓神硃拌各三錢　甘杞子三錢　北五味五分

廣玉金一錢五分　密蒙花三錢

服法： 每次加服羊肝丸一錢、磁硃丸一錢。

針科驗方

一　治兩目紅腫如火法　　•周宏裕交流•

針灸：針肝俞穴，位在第九第十胸椎棘之間，旁開一寸五分。

二　治氣管性喘急法　　•周宏裕交流•

針灸：針璇璣穴，位在天突穴下一寸，胸骨柄中央，陷中。

三　治心臟病心肌炎法　　•周宏裕交流•

症狀：心臟衰弱，大小循環血流障礙，面色蒼白，脈細唇紫，休克現象。

針灸：針心俞穴，位在第五第六胸椎棘突之間，旁開一寸五分處。

四　治腸炎法　　•周宏裕交流•

症狀：腹瀉水，鳴聲一天十數次，腹中痛時卽瀉，便色黃。

針灸：針大腸穴，在第十六椎之下，卽在第四、第五腰椎棘突之間，旁開一寸五分處。

[General Information]
书名=中医验方交流集
作者=邹云翔　范宝书编校
页数=41
SS号=10444180
DX号=
出版日期=1955年05月第1版
出版社=江苏人民出版社

目录